

Вирусный клещевой энцефалит. Вакцинация

ВАКЦИНАЦИЯ – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСНОГО КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

КТО ПОДЛЕЖИТ ВАКЦИНАЦИИ

- Проживающие на эндемичных по ВКЭ территориях
- Выезжающие на эндемичные территории
- Лица, выполняющие работы, связанные с высоким риском контакта с клещами
- Работающие с живыми культурами возбудителя ВКЭ

КАК ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – 1 месяц

Первая ревакцинация – через год, последующие ревакцинации – каждые 3 года

КОГДА ПРИВИТЬСЯ

Завершить курс (две прививки) - не позднее, чем за 2 недели до выезда на неблагополучную территорию





ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА - ВОВРЕМЯ!

1

ПЕРВАЯ ПРИВИВКА
ОКТАБРЬ - НОЯБРЬ

2

ВТОРАЯ ПРИВИВКА
СПУСТЯ 5-7 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ

3

ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПРИВИВКИ

4

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИВИВКА
КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА



egon.rospotrebnadzor.ru